



فرم شماره ۲- آموزش به بیمار و خانواده

مراقبت های پس از ترخیص

آموزش سلامت
HE.81.02
تاریخ آخرین بازبینی:
1401/08/05

لوله قفسه سینه (چست تیوب)

شماره پرونده:

نام خانوادگی:	نام:	بخش:	پزشک معالج:
نام پدر:	تاریخ تولد:	اتاق:	
	جنس: <input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد	تخت:	
	تشخیص (علت بستری):	تاریخ پذیرش:	

بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:

مراقبت در منزل:

- غذا خوردن به مقادیر کم و دفعات زیاد باید صورت گیرد.
 - از مصرف غذاهای نفاخ و دیر هضم اجتناب کنید.
 - در صورت مصرف الکل یا نوشیدنی های کافئیندار، آن را از رژیم غذایی خود حذف کنید.
 - جهت جلوگیری از بیبوست رژیم غذایی پرفیبر مانند سبزیجات، میوه و مایعات مصرف کنید.
 - تا ۲ هفته اول بیماری استراحت کنید و از انجام ورزش خودداری کنید.
 - در صورت اجازه پزشک می توانید ابتدا ورزش های سبک انجام دهید.
 - به طور مکرر در بین فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری استراحت کنید.
 - از انجام ورزشهای سنگین اجتناب کنید.
- مراقبت های بعد از خروج لوله
- پزشک با قرار دادن چند عدد گاز وازلین و گاز در محل کشیده شدن چست تیوب، پانسمان را با چسب ثابت میکنند.
 - پانسمان قفسه سینه را بررسی کرده و خروج هر نوع مایع چرکی و خیس شدن پانسمان را به پزشک گزارش دهید.
 - پانسمان محل چست تیوب را تا معاینه مجدد توسط پزشک باز نکنید.
 - کمر خود را راست و صحیح نگه دارید و بازو و شانه خود را حرکت دهید تا گرفتگی ایجاد نشود.
 - مرتب سرفه و تنفس عمیق انجام دهید.
 - در مورد زمان حمام کردن از پزشک خود سوال کنید.
 - در زمان تعیین شده توسط پزشک جهت بررسی ریه ها و محل لوله قفسه سینه مراجعه کنید.

در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید

- تب یا افزایش درجه حرارت بدن بیشتر از ۳۷/۸
- تنگی و سختی نفس
- قرمزی و وجود ترشح چرکی از اطراف محل خروج لوله
- سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی