

پس از اقدامات فوق لازم است اقدامات درمانی تکمیلی زیر نیز جهت بیمار انجام شود:

- ✓ برداشتن کیسه صفرا درمان انتخابی سنگ کیسه صفرا و کله سیستیت حاد می باشد.
- ✓ برداشتن کیسه صفرا با لاپاراسکوپ و یا جراحی باز انجام می شود.

❖ عواقب مورد انتظار

این بیماری در صورتی که به موقع تشخیص و درمان شود معمولاً با جراحی قابل درمان است. نام عمل جراحی کوله سیستکتومی می باشد

❖ عوارض احتمال جراحی

در صورت انجام عمل جراحی احتمال بروز عوارض زیر در بیمار وجود دارد:

- ✓ عفونت
- ✓ خونریزی
- ✓ سنگ باقی مانده
- ✓ انسداد ناشی از چسبندگی

❖ عوامل افزایش دهنده خطر

یکسری از عوامل خطر ابتلا به کوله سیستیت حاد را افزایش می دهد این عوامل عبارتند از:

- ✓ رژیم غذایی پر چرب و کم فیبر
- ✓ التهاب حاد لوزالمعده
- ✓ سابقه خانوادگی بیماری سنگ صفراوی
- ✓ مصرف قرص های ضد حاملگی

❖ تشخیص

جهت تشخیص کوله سیستیت حاد اقدامات زیر انجام می شود:

- ✓ سونوگرافی
- ✓ آزمایش خون

❖ درمان

درمان طبی کوله سیستیت حاد شامل موارد زیر است:

- ✓ تسکین درد
- ✓ از بین بردن تهوع بیمار
- ✓ مایع درمانی
- ✓ تجویز سرم متناسب با وضعیت بیمار
- ✓ آنتی بیوتیک

کیسه صفرا، کیسه ای کوچک است که در زیر کبد قرار گرفته است و صفرای تولیدشده در کبد در آن نگهداری می شود

کوله سیستیت حاد

عبارت است از التهاب حاد کیسه صفرا که در ۹۰٪ موارد علت آن سنگ صفرا است. موارد کوله سیستیت حاد بدون سنگ نیز دیده می شود. کوله سیستیت حاد معمولاً با انسداد دهانه کیسه صفرا و در نتیجه اتساع کیسه صفرا و در بعضی بیماران همراه با رشد باکتری در صفرا یا جدار کیسه صفرا ایجاد می شود.

❖ علائم

در صورت بروز کوله سیستیت حاد علائم زیر ممکن است در بیمار ایجاد شود:

- ✓ درد ناگهانی در ناحیه سردل که به پشت و شانه انتشار پیدا می کند.
- ✓ تهوع و استفراغ
- ✓ کاهش اشتها
- ✓ تب

❖ علل شایع

در بروز کوله سیستیت حاد علل زیر دخالت دارند:

- ✓ سنگ کیسه صفرا
- ✓ چاقی
- ✓ عفونت کیسه صفرا

آموزش سلامت

HE.37. 03

تاریخ آخرین بازبینی:


1401/02/28



بیمارستان امام سجاد(ع)رامسر

کوله سیستکتومی

(عمل جراحی بر داشتن کیسه صفرا)



❖ در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

✓ در صورت افزایش زردی پوست و ملتحمه و تیرگی ادرار، مدفوع خاکستری، بازگشت سوزش سر دل، آروغ زدن

✓ در صورت تب، سسکه، نفخ شکم و درد

❖ زمان مراجعه بعدی

✓ 7 روز بعد از عمل - جهت کشیدن بخیه ها

✓ جهت دریافت نتیجه پاتولوژی

✓ در صورت درد شدید شکم، تهوع و استفراغ، تب،

ضعف و بیحالی یا بی اشتهايي شديد

✓ در صورت دیدن علائمی چون قرمزی، ترشح، تورم،

درد، تب و زردی

* شماره تلفن بیمارستان و شماره داخلی
بخش مربوطه جهت رفع ابهامات آموزشی در
اختیار شما قرار می گیرد ،
شماره بیمارستان: ۵-۵۵۲۲۲۰۳۱-۰۱۱
شماره داخلی بخش: ()

❖ فعالیت

پس از عمل جراحی بعد از ۶-۴ هفته فعالیت عادی خود را از سر بگیرید.

❖ مراقبت

بعد از عمل جراحی مراقبت های زیر را انجام دهید:

✓ از نوشابه های الکلی استفاده نکنید.

✓ غذا را در حجم کم و به دفعات زیاد میل نمایید.

✓ غذای بیماران باید کم چرب باشد.

✓ به دفعات مکرر راه بروید.

✓ مایعات فراوان مصرف نمایید.

✓ هنگام سرفه محل عمل خود را نگه دارید.

✓ ۴ تا ۵ روز بعد از عمل جراحی (بسته به نظر پزشک

معالج) هنگام حمام پانسمان خود را بردارید. اما روی

محل عمل لیف نکشید.

✓ محل عمل همیشه تمیز و خشک باشد.

✓ بار سنگین بلند نکنید.